



Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (DNCB)

Fiche **SURVEILLANCE ACTIVE**
version du 11/09/2025



Fiche technique

Pourquoi surveiller de façon active ?

- Détecter et quantifier l'éventuelle extension de la maladie à partir du foyer d'INJOUX-GENISSIAT
- Pallier au défaut de surveillance de certains éleveurs

Quels signes rechercher ?

Signes non caractéristiques

Signes Généraux

Hyperthermie
Abattement
Perte d'état
Chute de production laitière
Troubles de la reproduction

Signes Locaux

Epiphora
Jetage
Ptyalisme
Œdème de l'auge et des membres
Boiterie

Signes caractéristiques (à chercher absolument)


Nodules cutanés

Localisation préférentielle : tête, encolure, mamelle, membres, périnée et organes génitaux
Leur caractérisation permet de dater le début de la phase clinique ([lien fiche datation](#))
Il n'est pas impossible de trouver des nodules à différents stades sur le même animal



Surveillance active de la Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (DNCB)

version du 11/09/2025



Comment surveiller ?

- Inspection (au moins à distance si impossibilité d'approche) de tous les élevages/lots ciblés par votre DD pour lesquels vous aurez été mandatés.
- Inspection **individuelle** lors des chantiers de vaccination
- Dans les deux cas, si doute sur un animal lors de l'examen à distance
 - o Prise de température
 - o Palpation des ganglions (préscapulaire et crural)
 - o Penser à regarder les mamelles

En cas de doute, contacter votre DD pour prélèvement de tous les animaux suspects

Tube de sang sur EDTA (+)

Ecouvillon (virocult) buccal, nasal, oculaire si ptyalisme, jetage ou épiphora (++)

Biopsies de nodules (+++)

[Lien **fiche dédiée** prélèvements](#)

